


Пересылочная клетка Гайдара «Жало».

Пересылочная клеточка «Жало» украинского производителя, среди других подобных клеточек считается одной из самых функциональных. Её можно использовать для:

- транспортировки матки и сопровождающих пчел;
- подсадки матки;
- переноса маточников из одной пчело-семьи в другую.



1. большой отдел для корма, или для маточников, или для выхода матки в пчелиную семью;
2. канал доступа пчел к матке, через маленькое кормовое отделение;
3. отдел для матки и пчёл;
4. заслонка - «дверь» для пчёл и матки;
5. крышка;
6. канал для заселения матки и сопровождающих пчел (наружный выступ для размещения клеточки между рамками);
7. зажимы для соединения клеток;
8. вентиляционные отверстия.

Отдел 3 предназначен для пребывания матки и сопровождающих пчел или маточника. Со стороны отсеков для корма имеется заслонка-«дверь» 4, которую можно удалить открыв оба прохода к матке, или открыть только один - меньший проход к матке, перевернув задвижку 4 на 90°. Тогда, через меньший отсек и узкий проход, пчёлы проходят к матке, но матка выйти из клеточки не может. Если оба отдела (большой 1 и маленький 2) полностью заполнить кормом (медовое канди или густой мёд) тогда пчёлы сначала зайдут к матке, забрав корм в маленьком кормовом отделе (2), а затем, забрав корм из большого (1), выпускают матку. Всё это время крышка 5 остаётся полностью закрытой, обычно внутри клеточки в ограниченном пространстве, пчёлы не проявляют агрессии к матке. Клеточку нужно расположить между рамками, открытой «дверью» - заслонкой (4) вниз, чтобы корм не стекал внутри клеточки и не испачкал матку и пчёл. Для пересылки матки в жаркое время, большое кормовое отделение 1 заполняется губчатым материалом с водой. Для подсадки матки губчатый материал нужно удалить и кормовое отделение 1 полностью заполнить кормом.

Обратите внимание на поведение пчёл-«хозяев» улья:

Просто положите клеточку сверху рамок: если пчёлы ведут себя агрессивно к клеточке и сопровождающим пчёлам – велика вероятность что и к матке они будут агрессивны.

Если пчёлы безматочной семьи проявляют интерес к сопровождающим пчёлам: обмениваются с ними информацией «лицом к лицу» - спокойно шевелят усиками, значит агрессии нет и велика вероятность что матка будет принята хорошо.

Будьте осторожны: после транспортировки матка плохо питалась, «похудела» и испытывала стресс, поэтому её нельзя просто выпускать из клеточки на верхние бруски рамок, даже если пчёлы принимающей семьи настроены к ней дружелюбно, матка может улететь !

Приёмы, повышающие приём маток:

- выпустить всех сопровождающих пчёл, кроме матки, из клеточки (через приоткрытый канал б) потому что «чужие» пчёлы могут вызвать агрессию у «хозяев» улья;
- добавление в корм закрывающий заслонку-дверь(4) муки из сушёной мяты, мелисы;



- нанесение на соседние рамки ароматического масла чабреца, мяты... (не герани !);
- обрызгивание рамок улья и пчёл из распылителя водой с настойкой мяты, мелисы, для придания нового, общего запаха клеточке и безматочной семье;
- хорошие результаты даёт применение спиртовых настоек, но как всегда со спиртным, между эффективной и токсической дозой очень маленькая разница;
- посадка в спокойную семью, рано утром или вечером, когда лёт пчёл ещё не начался или уже закончился и погода прохладная (пасмурно, не холодно, выше +16);
- НЕиспользование дымаря и минимальное беспокойство пчёл;
- расположение клеточки между рамками с печатным расплодом, там, где много молодых пчёл, которые «не знакомы» с любой маткой вообще;
- увеличение времени пребывания (до нескольких суток) матки в клеточке, внутри улья, для распространения её запаха по всему улью, матка должна быть бодрой и обеспечена кормом. **Этот способ НЕ рекомендуется после длительной пересылки;**
- если матка бодрая и активная, её можно искупать в воде или немного испачкать в мёде, в таком случае пчёлы начинают её чистить, заботятся о ней и принимают лучше, этот способ требует «твёрдой руки» и некоторого опыта;
- минимум за 2-3 часа перед посадкой матки нужно **удалить все маточники**, открытые и запечатанные;
- можно **убрать весь открытый расплод** и после принятия матки расплод - вернуть;
- если медосбор отсутствует или внезапно прервался из-за погоды, рекомендуется перед посадкой матки дать пчёлам подкормку;
- **лучше всего** подсаживать матку на сот с кормом (мёдом и пергой) и выходящим расплодом, без пчёл, для создания свиты из молодых пчёл. Для этого можно использовать **клеточку Никот для посадки маток**, или похожее приспособление.

Клеточка Никот для посадки маток



Посадка маток в пчеловодстве является одной из самых трудных задач. Сотни методов описанных в литературе не дают 100% гарантии успешного приема матки в новой пчелиной семье. Хорошие результаты дает метод запираания матки на соте. Для удобства этого метода, компания Никот разработала специальную клеточку для посадки маток.

Клеточка с размерами 148x130мм и высотой 11мм дает матке и вышедшим из расплода молодым пчелам, полную свободу в перемещении. **Внимание:** от стенки клеточки должно быть расстояние ~8мм, для свободного прохода пчел и распространения запаха новой матки по всему улью и успешного приёма.



Клеточку размещают на соте в таком месте, где есть расплод перед выходом, медовые и перговые ячейки. Кормовое отделение заполняется кормом. Закрепляют клеточку на соте четырьмя штырями входящими в комплект, **или саморезами 35 мм**. Для надежности дополнительно фиксируют резинкой. Через отверстие подсаживают матку (и пчёл которые были с маткой в пересылочной клеточке) и закрывают пробкой. Молодые пчелы, вышедшие из ячеек расплода под клеточкой, легко принимают матку и начинают обслуживать и защищать её. Через несколько дней можно открыть пробку и дать пчелам доступ к матке и возможность для матки самостоятельно покинуть клеточку. Если Вы видите, что через клеточку пчелы пытаются кормить матку, то это тоже свидетельствует о высоких шансах к успешному приему. Можно не открывать пробку, а ждать пока пчелы заберут весь корм (канди) и сами откроют доступ к матке. Для этого нужно выломать штырёк-заградитель прохода в кормовое отделение.

